f. N° 43 a noter mr favier

Cathéter a gallerie rabattue

Monsr favier, élève en chirurgie à l'hôtel des invalides, a présenté à la compagnie une nouvelle méthode de taille à laquelle il attribue beaucoup d'avantages. Cette méthode consiste à inciser la partie membraneuse de l'urèthre et le col de la vessie de dehors en dedans, avec un couteau dont la largeur doit être proportionné au volume de la pierre, et qui doit être conduit au moyen d'un cathéter à gallerie rabattue dans lequel il s'engage au moyen de rainures pratiquées sur son dos. L'une des faces de ce couteau, celle qui regarde le côté droit du malade est légèrement convexe sur sa longueur, ce qui en dirige le tranchant à gauche, autant qu'il soit possible. Le malade couché sur un plan incliné assujetti par des liens ordinaires, retenu par des aides, il faut introduire le cathéter, en incliner le manche sur l'aine droite, la faire tenir par un aide qui relève les bourses, faire au bas du périnée une incision de grandeur convenable avec un bistouri commun, inciser l'urèthre d'une petite quantité, introduire

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 36 n° 29

la pointe du coutau lithotome dans la cannelure du catheter, prendre cet instrument de la main gauche, faire glisser le lithotome jusqu'au bout de la cannelure, et s'il est nécessaire de se procurer une grande incision au col de la vessie, ramener beaucoup le catheter en bas, affin que son bec et le couteau dont il est armé, pénètrent plus avant.

La sonde à gallerie rabattue qu'employe ici mr favier a déjà été mise en usage par mr le cat, et depuis par mons. foin qui se sert d'instrumens presque semblable aux siens, comme on peut le voir dans son mémoire sur la taille imprimé parmi ceux de l'académie de dijon, et le résultat de cette nouvelle méthode a beaucoup de rapport avec celui de la manière de tailler imaginée en premier lieu par mons. Le Dran, et ensuite perfectionné par mr Pouteau. cependant il en differe en ce que mess. le Dran et pouteau proposent de couper le col de la vessie sur une sonde droite introduite par la premiere incision faite au périné, au lieu que mr

Fasius en fait le débridement au moyen du cathéter même dont le bec montant de bas en haut, éloigne cette partie de l'intestin rectum que l'on doit éviter avec le plus grand soin.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

J'ai assisté à plusieurs opérations faites sur des cadavres par mr Fasius, et je puis assurer qu'elles ont été bien réussi ; que son procédé est facile ; que la coupe est nette ; qu'elle n'intéresse d'autres parties que celles qu'il a pour but d'inciser, et qu'il fait au col de la vessie une incision aussi large qu'on le désire, de sorte que si c'est une perfection réelle de l'opération de la taille de pouvoir couper toute la prostate sans blesser le rectum, et sans faire dans la graisse qui avoisine cet intestin et le col de la vessie une incision trop étendue, la nouvelle méthode que propose mr Fasius paraît avoir beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients, au moins autant qu'il soit possible d'en juger par la simple spéculation. Il seroit seulement à désirer que ce [illegible]

forme est présenté les idée d'une manière peu nette

et peu précise, car je ne puis dissimuler à la compagnie

que son mémoire est écrit d'une manière à ne pas donner une

idée bien avantageuse de son travail, et qu'il n'a fallu quelque

explication verbale, pour bien comprendre ce qu'il contenoit

de bon.

Ce 17 xbre 1770 Sabatier